IPSS_prova

Questo test valuta la severità dei sintomi causati dall'ipertrofia prostatica, è uno strumento utile per comprendere e seguire nel tempo l'evoluzione della Sua condizione.

Please enter your email:

1 – Incompleto svuotamento: quante volte ha avvertito un senso di incompleto svuotamento della vescica dopo la minzione?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte
○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

2 – Frequenza: quante volte ha urinato dopo meno di due ore dall'ultima minzione?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte
○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

3 – Intermittenza: le è mai capitato di dover urinare in più tempi?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte
○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

4 – Urgenza: quante volte ha avuto difficoltà a trattenere l'urina?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte

○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

5 – Flusso urinario debole: quanto spesso il getto urinario le è parso debole?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte
○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

6 – Sforzo: quante volte si è dovuto sforzare per iniziare ad urinare?

○ Nessuna volta
○ Meno di una volta su 5
○ Meno della metà delle volte
○ Circa le metà delle volte
○ Più della metà delle volte
○ Quasi sempre

7 – Nicturia: quante volte si è dovuto alzare durante la notte per andare ad urinare?

○ Nessuna volta
○ 1 volta
○ 2 volte
○ 3 volte
○ 4 volte
○ 5 o più volte

Vai al risultato _b7665afc0 _0.8436930