

# IPSS

## IPSS: International Prostate Symptom Score

Questo test valuta il grado di severità dei sintomi urinari causati dall'Ipertrafia Prostatica.

8 Ottobre 2024

Inserisca la Sua mail per ricevere il risultato del test e mostrarlo al Medico durante la visita

1. Incompleto svuotamento: quante volte ha avvertito un senso di incompleto svuotamento della vescica dopo la minzione?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa la metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre
- 

2. Frequenza: quante volte ha urinato dopo meno di due ore dall'ultima minzione?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa la metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre
- 

3. Intermittenza: le è mai capitato di dover urinare in più tempi?

- Nessuna volta
- Meno di una volta su 5
- Meno della metà delle volte
- Circa la metà delle volte
- Più della metà delle volte
- Quasi sempre

- 
4. Urgenza: quante volte ha avuto difficoltà a trattenere l'urina?
- Nessuna volta
  - Meno di una volta su 5
  - Meno della metà delle volte
  - Circa la metà delle volte
  - Più della metà delle volte
  - Quasi sempre
- 
5. Flusso urinario debole: quanto spesso il getto urinario le è parso debole?
- Nessuna volta
  - Meno di una volta su 5
  - Meno della metà delle volte
  - Circa la metà delle volte
  - Più della metà delle volte
  - Quasi sempre
- 
6. Sforzo: quante volte si è dovuto sforzare per iniziare ad urinare?
- Nessuna volta
  - Meno di una volta su 5
  - Meno della metà delle volte
  - Circa la metà delle volte
  - Più della metà delle volte
  - Quasi sempre
- 
7. Nicturia: quante volte si è dovuto alzare durante la notte per andare ad urinare?
- Nessuna
  - 1 volta
  - 2 volte
  - 3 volte
  - 4 volte
  - 5 o più volte
-